


СИБИРСКАЯ ЯЗВА

ФОРМЫ



ВОЗБУДИТЕЛЬ
Бациллы **антрацис** хорошо растут в мясопептонных средах. Они выделяют экзотоксин - сильнейший яд, вызывающий отек. Вне организма человека или животного образует споры с большой устойчивостью к физико-химическим воздействиям, сохраняющиеся во внешней среде до 10 лет.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Домашние животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи).









ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

- Контактным путем (при разделке туш и т.д.)
- При употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами
- Через воду, почву, меховые изделия и т.д.



Легочная
Заражение происходит при вдыхании пыли со спорами или вегетативными формами возбудителя сибирской язвы
Летальность: 100%

Кишечная
Заражение происходит при употреблении инфицированных продуктов
Летальность: 50%


Кожная (наиболее распространенная) Летальность: 10-20%

 Появляется пятно красноватого цвета, похожее на укуса насекомого, начинается зуд	 Пятно заметно уплотняется, зуд усиливается, переходит нередко в язву	 Развивается пузырь — пузырек, наполненный серозным содержимым, затем кровью	 При расчесывании пузырек срывается, и образуется язва с черным дном
 Края язвы начинают прилупать, образуя воспалительный валик	 Возникает отек, который начинает быстро распространяться	 Дно язвы западает, по краям образуются «дочерние» пузырьки	 Язва достигает 8-15 мм и называется сибиряковым харбукулом

ПРОФИЛАКТИКА

-  Выявленных больных животных следует изолировать, а их трупы сжигать; инфицированные объекты необходимо обеззараживать
-  Лица, находившиеся в контакте с больными животными или заразным материалом, подлежат активному врачебному наблюдению в течение 3 недель

ЛЕЧЕНИЕ

-  Независимо от клинической формы болезни лечение состоит в использовании специфического противосибирязвенного глобулина и антибиотиков

ГБУВ МО «Терветуправление №5» обращает внимание,

что в целях предотвращения возникновения и распространения сибирской язвы владельцы восприимчивых животных обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее - специалисты госветслужбы), восприимчивых животных для осмотра;
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных в том же помещении (месте), в котором они находились;
- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, организациях, в которых содержатся восприимчивые животные, противоэпизоотических и других мероприятий;
- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по сибирской язве.

С профилактической целью, ветеринарной службой Московской области проводится **БЕСПЛАТНАЯ** вакцинация восприимчивых животных против сибирской язвы.

Записаться на вакцинацию или сообщить о случаях заболевания животного вы можете по многоканальному телефону **+7-499-1139409**